



MEGACOLON DEL ADULTO Dr. Alejandro Barrera

Se define como la dilatación, elongación e hipertrofia permanente del colon. Entre las etiologías más frecuentes destacan el megacolon idiopático, el Chagásico y la enfermedad de Hirschprung del adulto. La presentación clínica en los casos simples es de un cuadro de constipación crónica pertinaz, y en los complicados por casos de fecaloma u obstrucción intestinal causada por vólvulo de sigmoides.

Estudio preoperatorio específico :

- Enema Baritado de doble contraste
- Ecotomografía abdominal (opcional)
- Hemaglutinación indirecta para Chagas
- Inmunofluorescencia indirecta para Chagas
- Biopsia rectal de grosor total (opcional)
- Evaluación miocardiopatía asociada
- Tiempo de tránsito colónico en pacientes jóvenes y sospecha de megacolon idiopático

Indicaciones quirúrgicas electivas

- Antecedentes de vólvulo y/o fecaloma.
- Constipación intratable

Técnica quirúrgica

En Megacolon chagásico y congénito:

Operación de Duhamel con anastomosis primaria con sutura mecánica circular nº 29-34. Drenaje pelvis.

En Megacolon idiopático y megacolon recidivado:

Colectomía total con ileo-rectonastomosis L-T o T-T con sutura mecánica circular nº25-31. Drenaje opcional.

En vólvulo senil:

Sigmoidectomía con colo-rectoanastomosis con sutura mecánica circular nº25-31. Drenaje opcional.